

Aprile 2024

RAZZA GARFAGNINA

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 68 osservazioni delle quali 50 sono state rilevate durante la Fase1 del Progetto DualBreeding.

Tabella 1. Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	0	0	Intero	36	52.9	Assenti	0	0
Grigio	25	36.7	Pezzato	14	20.6	Portate in alto	20	29.4
Nero	10	14.7	Spruzzato	4	5.9	Portate in avanti	43	63.2
Bruno Chiaro	17	25.0	Striscia Dorsale	14	20.6	Rivolte in basso	5	7.4
Bruno Scuro	15	22.6				Decornato	0	0
Castano	1	2.0						
Fromentino	0	0						
Rosso	0	0						
Rosso Mogano	0	0						

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

Cinisara	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	68	143.2	11.7	120	165
Profondità addominale (cm)	68	70.6	9.9	55	90
Lunghezza tronco (cm)	68	77.5	7.9	70	100
Lunghezza groppa (cm)	68	49.2	8.0	32	60
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	68	42.4	7.0	30	55
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	68	27.2	6.5	10	40
Inclinazione groppa (punteggio)	68	4.0	1.2	2	6
Prof. mammaria (cm)	68	22.2	7.2	0	40
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	68	10.6	3.3	4	18
BCS (punteggio)	68	3.3	0.7	2	5
Muscolosità anteriore (punteggio)	68	4.3	1.4	2	9
Muscolosità Posteriore (punteggio)	68	4.0	1.5	2	8

Aprile 2024

Tabella 3. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	54	79.4	13	19.2	1	1.4
Dorso Arcuato	62	91.2	6	8.8	0	0.0
Spalle Deboli	57	83.8	11	16.2	0	0.0
Garretti serrati posteriormente	61	89.7	7	10.3	0	0.0
Unghia aperta	68	100.0	0	0.0	0	0.0

Tabella 4. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	68	100.0	0	0.0	0	0.0
Capezzoli non perpendicolari	62	91.2	6	8.8	0	0.0
Capezzoli soprannumerari	68	100.0	0	0.0	0	0.0
Mammella spaccata tra i quarti	66	97.1	2	2.9	0	0.0
Piano inclinato	65	95.6	3	4.4	0	0.0

Tabella 5. Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	9	13.2	20	29.4	39	57.4
Durante la mungitura	68	100.0	0	0.0	0	0.0
Verso l'uomo	9	13.2	20	29.4	39	57.4