

Caratterizzazione fenotipica della razza Cabannina

Tabella A: Caratteristiche del mantello e della corna.

| Colore mantello | N° | % | Mantello distrib. | N° | % | Corna | N° | % |
|-----------------|----|------|-------------------|----|------|-------------------|----|------|
| Bianco | 0 | 0 | Intero | 10 | 15.1 | Assenti | 3 | 4.6 |
| Grigio | 1 | 1.5 | Pezzato | 0 | 0 | Portate in alto | 34 | 51.5 |
| Nero | 1 | 1.5 | Spruzzato | 0 | 0 | Portate in avanti | 25 | 37.9 |
| Bruno Chiaro | 9 | 13.6 | Striscia Dorsale | 56 | 84.9 | Rivolte in basso | 4 | 6.1 |
| Bruno Scuro | 1 | 1.5 | | | | Decornato | 0 | 0 |
| Castano | 54 | 81.8 | | | | | | |
| Fromentino | 0 | 0 | | | | | | |
| Rosso | 0 | 0 | | | | | | |
| Rosso Mogano | 0 | 0 | | | | | | |

Tabella B: Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica.

| Carattere | N° | Media | Ds | Min. | Max. |
|-------------------------------------|----|-------|-----|------|------|
| Altezza al sacro (cm) | 66 | 124.0 | 4.2 | 115 | 134 |
| Profondità addominale (cm) | 66 | 69.5 | 6.1 | 58 | 88 |
| Lunghezza tronco (cm) | 66 | 88.2 | 5.8 | 72 | 99 |
| Lunghezza groppa (cm) | 66 | 44.8 | 2.2 | 40 | 50 |
| Larghezza groppa bisiliaca (cm) | 66 | 42.9 | 2.3 | 38 | 50 |
| Larghezza groppa bisischiatica (cm) | 66 | 20.3 | 2.6 | 15 | 27 |
| Inclinazione groppa (punteggio) | 66 | 4.5 | 1.1 | 3 | 7 |
| Prof. mammaria (cm) | 66 | 8.1 | 5.4 | -6 | 19 |
| Lunghezza capezzoli anteriori (cm) | 66 | 7.0 | 1.9 | 3 | 12 |
| BCS (punteggio) | 66 | 3.2 | 0.6 | 2 | 4 |
| Muscolosità anteriore (punteggio) | 66 | 5.6 | 1.0 | 3 | 8 |
| Muscolosità Posteriore (punteggio) | 66 | 5.6 | 1.2 | 3 | 8 |

Tabella C: Ripartizione dei soggetti in relazione alle presenza di difetti inerenti la struttura degli animali e della mammella.

| | Difetto Assente | | Difetto Lieve | | Difetto Marcato | |
|---------------------------------|-----------------|------|---------------|------|-----------------|-----|
| | N° | % | N° | % | N° | % |
| Dorso Insellato | 58 | 87.9 | 7 | 10.6 | 1 | 1.5 |
| Dorso Arcuato | 62 | 93.9 | 4 | 6.1 | 0 | 0 |
| Spalle Deboli | 53 | 80.3 | 12 | 18.2 | 1 | 1.5 |
| Garretti serrati posteriormente | 27 | 40.9 | 35 | 53.0 | 4 | 6.1 |
| Unghia aperta | 65 | 98.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| Capezzoli a imbuto | 49 | 74.2 | 14 | 21.2 | 3 | 4.6 |
| Capezzoli non perpendicolari | 51 | 77.3 | 15 | 22.7 | 0 | 0 |
| Capezzoli soprannumerari | 53 | 80.3 | 12 | 18.2 | 1 | 1.5 |
| Mammella spaccata tra i quarti | 45 | 68.2 | 20 | 30.3 | 1 | 1.5 |
| Piano inclinato | 31 | 47.0 | 30 | 45.4 | 5 | 7.6 |

Tabella D: Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento.

| | Non osservabile | | Tranquillo | | Nervoso | |
|---------------------|-----------------|------|------------|-----|---------|-----|
| | N° | % | N° | % | N° | % |
| Verso altri animali | 57 | 86.4 | 6 | 9.1 | 3 | 4.5 |
| In mungitura | 64 | 97.0 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| Verso l'Uomo | 65 | 98.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |