

## RAZZA CABANNINA

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 94 osservazioni delle quali 66 sono state rilevate durante la Fase 1 del Progetto DualBreeding.

**Tabella 1.** Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	0	0	Intero	16	17.0	Assenti	5	5.3
Grigio	1	1.1	Pezzato	2	2.1	Portate in alto	50	53.2
Nero	1	1.1	Spruzzato	1	1.1	Portate in avanti	33	35.1
Bruno Chiaro	10	10.6	Striscia Dorsale	75	79.8	Rivolte in basso	4	4.3
Bruno Scuro	1	1.1				Decorato	2	2.1
Castano	81	86.2						
Fromentino	0	0						
Rosso	0	0						
Rosso Mogano	0	0						

**Tabella 2.** Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	94	123.8	4.2	115	134
Profondità addominale (cm)	94	68.0	6.3	57	88
Lunghezza tronco (cm)	94	85.6	7.1	70	99
Lunghezza groppa (cm)	94	45.1	2.5	40	56
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	94	43.3	2.5	38	50
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	94	21.2	3.2	15	31
Inclinazione groppa (punteggio)	94	4.5	1.0	3	7
Prof. mammaria (cm)	94	9.7	6.9	-10	32
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	94	7.0	2.0	3	12
BCS (punteggio)	94	3.3	0.7	2	5
Muscolosità anteriore (punteggio)	94	5.5	1.1	3	8
Muscolosità Posteriore (punteggio)	94	5.6	1.3	2	9

**Tabella 3.** Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	80	85.1	13	13.8	1	1.1
Dorso Arcuato	90	95.7	4	4.3	0	0

Spalle Deboli	73	77.7	19	20.2	2	2.1
Garretti serrati posteriormente	44	46.8	45	47.9	5	5.3
Unghia aperta	93	98.9	1	1.1	0	0

**Tabella 4.** Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	71	75.5	18	19.2	5	5.3
Capezzoli non perpendicolari	77	81.9	17	18.1	0	0
Capezzoli soprannumerari	73	77.7	20	21.3	1	1
Mammella spaccata tra i quarti	70	74.5	22	23.4	2	2.13
Piano inclinato	55	58.5	33	35.1	6	6.4

**Tabella 5.** Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
<b>Verso gli altri animali</b>	57	60.6	33	35.1	4	4.3
<b>Durante la mungitura</b>	64	68.1	29	30.9	1	1.1
<b>Verso l'uomo</b>	65	69.2	27	28.7	2	2.1