

RAZZA MODICANA

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 1.413 osservazioni delle quali 876 sono state rilevate durante la Fase1 del Progetto DualBreeding.

Tabella 1. Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	0	0	Intero	1338	94.7	Assenti	50	3.5
Grigio	0	0	Pezzato	6	0.4	Portate in alto	1008	71.3
Nero	13	0.9	Spruzzato	0	0	Portate in avanti	185	13.1
Bruno Chiaro	5	0.4	Striscia Dorsale	69	4.9	Rivolte in basso	20	1.4
Bruno Scuro	3	0.2				Decornato	150	16.6
Castano	17	1.2						
Fromentino	183	12.9						
Rosso	838	59.3						
Rosso Mogano	0	0						

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	1413	150.0	8.4	130	170
Profondità addominale (cm)	1413	77.5	7.3	56	95
Lunghezza tronco (cm)	1413	82.3	5.9	70	110
Lunghezza groppa (cm)	1413	46.6	5.6	34	62
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	1413	47.3	4.6	33	63
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	1413	25.3	6.1	10	39
Inclinazione groppa (punteggio)	1413	6.4	1.1	1	9
Prof. mammaria (cm)	1413	12.4	7.3	-15	40
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	1413	9.6	3.2	3	25
BCS (punteggio)	1413	2.8	0.4	1.75	4.5
Muscolosità anteriore (punteggio)	1413	3.1	1.2	1	9
Muscolosità Posteriore (punteggio)	1413	3.1	1.3	1	9

Marzo 2023

Tabella 3. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	716	50.7	602	42.6	95	6.7
Dorso Arcuato	1380	97.7	33	2.3	0	0.0
Spalle Deboli	949	67.2	435	30.8	29	2.0
Garretti serrati posteriormente	1080	76.4	285	20.2	48	3.4
Unghia aperta	1013	71.7	330	23.4	70	5.0

Tabella 4. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	1009	71.4	293	20.7	111	7.9
Capezzoli non perpendicolari	1204	85.2	197	13.9	12	0.8
Capezzoli soprannumerari	884	62.6	439	31.1	90	6.4
Mammella spaccata tra i quarti	770	54.5	582	41.2	61	4.3
Piano inclinato	769	54.4	582	41.2	123	8.7

Tabella 5. Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	917	64.9	489	34.6	7	0.5
Durante la mungitura	931	65.9	470	33.3	12	0.9
Verso l'uomo	830	58.7	524	37.1	59	4.2