

RAZZA PEZZATA ROSSA D'OROPA

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono frutto della raccolta di informazioni sulle caratterizzazioni fenotipiche effettuate durante l'intera durata del Progetto DualBreeding Fase 1 e sua successiva Fase 2, ancora in fase di svolgimento.

La presente statistica si basa su 1.718 osservazioni delle quali 907 sono state rilevate durante la Fase1 del Progetto DualBreeding.

Tabella 1. Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri distribuzione del mantello, colore del mantello e portamento delle corna

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	84	4.9	Intero	1291	75.2	Assenti	2	0.1
Grigio	0	0	Pezzato	418	24.3	Portate in alto	1529	89.0
Nero	326	19.0	Spruzzato	9	0.5	Portate in avanti	175	10.2
Bruno Chiaro	2	0.1	Striscia Dorsale	0	0	Rivolte in basso	12	0.7
Bruno Scuro	4	0.2				Decornato	0	0
Castano	0	0						
Fromentino	106	6.2						
Rosso	1103	64.2						
Rosso Mogano	0	0						

Tabella 2. Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica

	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	1718	141.8	4.6	125	158
Profondità addominale (cm)	1718	79.3	5.0	60	105
Lunghezza tronco (cm)	1718	99.2	5.4	71	113
Lunghezza groppa (cm)	1718	48.7	3.3	40	69
Larghezza groppa bisiliaca (cm)	1718	47.1	3.5	32	63
Larghezza groppa bisischiatica (cm)	1718	31.5	3.3	22	40
Inclinazione groppa (punteggio)	1718	5.8	0.8	3	9
Prof. mammaria (cm)	1718	7.2	3.3	-9	20
Lunghezza capezzoli anteriori (cm)	1718	7.6	2.1	3	17
BCS (punteggio)	1718	3.5	0.6	1.25	5
Muscolosità anteriore (punteggio)	1718	5.2	1.4	2	9
Muscolosità Posteriore (punteggio)	1718	5.0	1.4	1	9

Marzo 2023

Tabella 3. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la struttura degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	1580	92.0	129	7.5	9	0.5
Dorso Arcuato	1546	90.0	169	9.8	3	0.2
Spalle Deboli	1527	88.9	187	10.9	4	0.2
Garretti serrati posteriormente	1309	76.2	385	22.4	24	1.4
Unghia aperta	1444	84.1	264	15.4	10	0.6

Tabella 4. Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti la mammella degli animali

	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	1301	75.7	388	22.6	29	1.7
Capezzoli non perpendicolari	1363	79.3	299	17.4	56	3.3
Capezzoli soprannumerari	1028	59.8	664	38.7	26	1.5
Mammella spaccata tra i quarti	1461	85.0	241	14.0	16	0.9
Piano inclinato	1365	79.5	337	19.6	16	0.9

Tabella 5. Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso i conspecifici, l'uomo e in mungitura

	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	616	35.9	1061	61.8	41	2.4
Durante la mungitura	790	46.0	852	49.6	76	4.4
Verso l'uomo	592	34.5	1063	61.9	63	3.7