

## Razza Pinzgauer

**(1086 rilievi totali: 792 rilievi in fase 1 e 294 in fase 2, ancora in svolgimento)**

**Tabella 1.** Ripartizione dei soggetti relativamente ai caratteri di colore del mantello, distribuzione del mantello e portamento delle corna.

Colore mantello	N°	%	Mantello distrib.	N°	%	Corna	N°	%
Bianco	33	3.0%	Intero	19	1.7%	Assenti	447	41.2%
Grigio	0	0.0%	Pezzato	17	1.6%	Portate in alto	200	18.4%
Nero	4	0.4%	Spruzzato	15	1.4%	Portate in avanti	171	15.7%
Bruno Chiaro	2	0.2%	Striscia Dorsale	1035	95.3%	Rivolte in basso	34	3.1%
Bruno Scuro	5	0.5%				Decornato	234	21.5%
Castano	0	0.0%						
Fromentino	1	0.1%						
Rosso	33	3.0%						
Rosso Mogano	1008	92.8%						

**Tabella 2.** Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica.

Rilevamento	N°	Media	Ds	Min.	Max.
Altezza al sacro (cm)	1086	141.5	5.6	120	170
Profondità Addominale (cm)	1086	87.7	5.3	70	101
Lunghezza Tronco (cm)	1086	92.5	6.0	75	110
Lunghezza Groppa (cm)	1086	54.4	3.2	45	68
Larghezza Groppa Bis-iliaca (cm)	1086	55.6	4.0	45	70
Larghezza Groppa Bis-ischiatrica (cm)	1086	21.6	4.3	13	40
Inclinazione Groppa (punti)	1086	4.8	1.3	1	9
Profondità Mammaria (cm)	1086	13.4	8.5	-16	35
Lunghezza Capezzoli Anteriori (cm)	1086	6.2	1.8	1	15
BCS (punti)	1086	3.5	9.8	1	325
Muscolosità Anteriore (punti)	1086	3.6	1.2	1	8
Muscolosità Posteriore (punti)	1086	4.0	1.2	1	8

**Tabella 3.** Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti alla struttura degli animali.

Difetto	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Dorso Insellato	922	84.9%	130	12.0%	34	3.1%
Dorso Arcuato	980	90.2%	98	9.0%	8	0.7%
Spalle Deboli	891	82.0%	158	14.5%	37	3.4%
Garretti serrati posteriormente	928	85.5%	123	11.3%	35	3.2%
Unghia Aperta	1057	97.3%	25	2.3%	4	0.4%

**Tabella 4.** Ripartizione dei soggetti in relazione alla presenza di difetti inerenti alla mammella.

Difetto	Difetto Assente		Difetto Lieve		Difetto Marcato	
	N°	%	N°	%	N°	%
Capezzoli a imbuto	988	91.0%	78	7.2%	20	1.8%
Capezzoli non perpendicolari	1035	95.3%	42	3.9%	9	0.8%
Capezzoli Soprannumerari	1024	94.3%	51	4.7%	11	1.0%
Mammella spaccata tra i quarti	981	90.3%	92	8.5%	13	1.2%
Piano inclinato	967	89.0%	91	8.4%	28	2.6%

**Tabella 5.** Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento verso conspecifici, mungitura e operatori.

Temperamento	Non osservabile		Tranquillo		Nervoso	
	N°	%	N°	%	N°	%
Verso gli altri animali	1053	97.0%	31	2.9%	2	0.2%
Durante la mungitura	688	63.4%	316	29.1%	82	7.6%
Verso l'uomo	1046	96.3%	37	3.4%	3	0.3%